



Siltuximab(Sylvant[®])

薩溫珂凍晶注射劑

100 or 400 mg/vial | 民眾閱讀版 | 傅彥歲藥師撰

作用機轉

作用於人類白介素6 (Interleukin-6, IL-6)之單株抗體，能透過結合 IL-6 抑制其活性，進而降低卡斯爾曼氏病相關的過度發炎反應。

致吐性及骨髓方面副作用


- 致吐性：微致吐風險 (< 10%)
- 抑制血球生長程度：血小板低下 (15% ; 3~4級：4%)、白血球減少 (13% ; 3~4級：4%)、貧血 (9% ; 3~4級：4%)

注意事項及常見副作用

- 常見副作用為皮膚癢、紅疹、體重增加、高尿酸血症、上呼吸道感染。
- 其他各系統副作用如下：
 1. 心臟血管方面副作用：水腫 (26% ; 3~4 級：2%)、低血壓 (4% ; 3~4 級：2%)。
 2. 皮膚方面副作用：搔癢 (28% ; 3~4 級：2%)、色素沉澱 (4%)、濕疹 (4%)、乾癬(4%)、皮膚乾燥 (4%)。
 3. 中樞神經方面副作用：頭痛 (8%)、食慾降低 (4%)。
 4. 代謝及內分泌方面副作用：體重增加 (19% ; 3~4 級：2%)、高尿酸血症 (11% ; 3~4 級：2%)、高血糖 (8%)、高膽固醇血症 (4%)、脫水 (4% ; 3~4 級：2%)。

常見適應症

- 卡斯爾曼氏病

- 
5. 腸胃道方面副作用：腹脹或腹絞痛 (12%)、噁心感 (9%；3~4 級：2%)、便秘 (8%)、咽喉疼痛 (8%)。
 6. 免疫方面副作用：上呼吸道感染 (26%；3~4 級：2%)、下呼吸道感染 (8%；3~4 級：4%)、過敏或輸注反應 (4.9%)。
 7. 腎臟方面副作用：腎功能不全 (8%)。

註釋：癌症藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，會包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE，又稱常見毒性標準)，用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微 (1 級)、中級 (2 級)、嚴重 (3 級) 或致命 (4 級)、死亡 (5 級)。發生 3 級以上的副作用時，需醫療介入處理且進行劑量調整或停藥。4 級大多需要住院介入醫療處理。

藥師小叮嚀

1. 此藥可能會減低您的免疫力，若有以下症狀請立即通知您的醫師，或前往就醫：
 - ✓ 發燒。
 - ✓ 冒冷汗或冷顫。
 - ✓ 持續咳嗽或呼吸困難。
 - ✓ 其他感染相關徵兆。
 - ✓ 呼吸困難。
 - ✓ 胸悶、胸痛。
 - ✓ 胃絞痛、胃部不適。
 - ✓ 嘴唇腫脹。
 - ✓ 皮膚起紅疹
2. 如有使用其他藥物，請藥師檢查是否有藥物之間交互作用。
3. 治療期間不可施打活性疫苗，且施打疫苗前須向您的醫師確認時程與合宜性。
4. 此藥對於孕婦及胎兒的影響未知。若有計畫生育之考量，請告知您的醫師，並於停藥後的三個月內都須執行避孕措施。
5. 目前仍未知此藥是否能透過乳汁分泌，用藥期間請避免哺乳。