




Enasidenib (Idhifa®)

Enasidenib 膜衣錠

50; 100 mg/tab | 民眾閱讀版 | 傅彥崑藥師撰

作用機轉

標靶藥物。本藥能與癌細胞中突變的 IDH2 代謝酵素結合，並阻止其製造致癌代謝物，進而達到抗癌效果。

致吐性及骨髓方面副作用

1. 致吐性：中度致吐性 (30~90%的病人可能有嘔吐副作用)
2. 血液學方面副作用：分化症候群 (14%；3/4 級：7%)；非感染性白血球增多 (12%；3/4 級：6%)。

注意事項及常見副作用

- 患有復發或難治性且具 IDH2 突變的急性骨髓性白血病成人患者

- 常見副作用 (≥20%) 包括：噁心、嘔吐、腹瀉、膽紅素升高、食慾下降。
- 其他各系統副作用如下：
1. 腸胃道方面副作用：噁心 (50%；3/4 級：5%)、腹瀉 (42%；3/4 級：8%)、嘔吐 (34%；3/4 級：2%)
 2. 呼吸系統與胸腔方面副作用：肺水腫 (<10%)、急性呼吸窘迫症候群 (<10%)
 3. 代謝性副作用：食慾降低 (34%；3/4 級：4%)、腫瘤溶解症候群 (6%；3/4 級：6%)
 4. 神經系統副作用：味覺障礙 (12%)
 5. 實驗室數值異常：膽紅素上升 (81%；3/4 級：15%)、血鈣下降 (74%；3/4 級：8%)、血鉀下降 (41%；3/4 級：15%)、血磷下降 (27%；3/4 級：8%)

藥師小叮嚀

1. 本藥每日固定時間服用一次，不拘空腹或飯後。本藥需整粒吞服，請勿剝半、磨粉或咀嚼錠劑。
2. 若忘記服藥，或服藥後不慎發生嘔吐，於當日想起來時可立刻補服當日劑量。明日準時服用一般劑量。
3. 如有使用其他藥物，請藥師檢查是否有藥物之間交互作用。
4. 本藥可能引起一種稱為「分化症候群」的反應。若您發現有如發燒、呼吸短促、體重突然增加、水腫等症狀，請立即前往急診或聯絡您的醫療團隊，這可能是需要緊急處理的狀況。大多症狀經類固醇治療後兩天內會有所緩解。
5. 本藥可能延後咖啡因的代謝，使得咖啡因效果與副作用增強。建議任何含咖啡因的食物或飲料需減量與減少攝取頻率，特別是對咖啡因敏感的患者。
6. 本藥可能會降低避孕藥的效果，建議更換其他避孕方式。
7. 治療期間若有以下症狀，請通知您的醫師與個案管理師：

發燒、咳嗽或呼吸困難、骨頭疼痛、體重迅速增加或手腿部腫脹	皮膚或眼睛變黃、茶色尿、腹痛
------------------------------	----------------
8. 若有計畫生育之考量，請告知您的醫師，無論男女患者，在服藥期間及停藥後的 2 個月內，都必須做好避孕措施。
9. 此藥對於母親乳汁的分布與對嬰兒的影響未知。服藥期間與停藥後 2 個月內都須避免哺乳。
10. 副作用等級 3 或 4 級即表示該副作用需要回診或入院接受治療。
11. 臨床監測項目：全血球計數、肝指數、血液動力學、呼吸與水腫症狀。

註釋：癌症藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，會包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的常見毒性標準，用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微(1級)、中級(2級)、嚴重(3級)或致命(4級)、死亡(5級)。發生3級以上的副作用時，需醫療介入處理且進行劑量調整或停藥。4級大多需要住院介入醫療處理。