

口服Ursodiol錠

Ursodiol 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Ursodiol	Uroso Tablet	利膽能錠	100 毫克/錠

作用：

常規用於造血幹細胞移植（HSCT）期間，主要目的在於預防及降低移植相關肝臟併發症，特別是由前處理療程與移植物免疫反應所導致的肝損傷。

用法：

- 開始時間：前處理療程開始前或同時
- 使用期間：持續至植入成功後直到移植後約第 90 - 100 天
- 給藥途徑：口服
- 常用劑量：8 - 15 mg/kg/day，一般一天使用二至三次，飯後服用。

使用目的：

1. 預防肝靜脈阻塞症候群（VOD/SOS）

- ◆ 降低毒性膽酸對肝細胞的傷害
- ◆ 改善膽汁流動、減少膽汁鬱積
- ◆ 已證實可降低移植後 VOD/SOS 的發生率與嚴重度

2. 減少膽汁鬱積型肝損傷

- ◆ 保護肝細胞免於高劑量化療或全身放射治療造成的膽酸毒性
- ◆ 降低血清膽紅素、ALP、GGT 上升

3. 降低肝臟型移植物抗宿主病（Hepatic GVHD）風險

- ◆ 減少膽管上皮發炎與損傷
- ◆ 與較低的肝臟 GVHD 發生率相關

4. 改善整體移植相關預後

- ◆ 降低肝臟併發症相關之移植相關死亡率
- ◆ 提升病人對前處理療程的肝臟耐受性

1. 服用此藥後，應定期找醫生檢查肝功能，並確定膽結石是否溶解。此藥的藥效產生慢，可能需要幾個月的時間才能將膽結石完全溶解。
2. 懷孕、授乳、對此藥或膽酸類藥物過敏，或正在服用其他藥物（如降血脂藥物、女性荷爾蒙、口服避孕藥等藥物），請務必告知醫生。
3. 不能與含鋁的制酸劑一起服用。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時，立即服用。若已接近下一次服藥時間，只需服用下一次劑量，不可一次服用雙倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
常見副作用包括腹瀉、腹部不適、噁心。 若出現嚴重腹瀉或影響口服吸收，可考慮調整劑量或暫停。	請告知醫療人員。 。