

Valganciclovir 錠

Co-trimoxazole 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Valganciclovir	Balcyte Tablet	克毒癒膜衣錠	Valganciclovir 450 毫克/錠

作用：

是一種口服抗病毒前藥，其活性成分為 ganciclovir，主要用於造血幹細胞移植 (HSCT) 中，預防與治療巨細胞病毒 (CMV) 感染。

給藥途徑：口服

- ◆ **給藥時機：**在植入成功後或口服吸收良好時啟動，常在移植後早期期間使用（移植後第 +30 天到 +100 天），或視巨細胞病毒 (CMV) 風險使用。
- ◆ **預防／預先治療 (成人)：**900 毫克，每日一次。
- ◆ **治療劑量：**誘導期每次 900 毫克，每日服用兩次，之後維持期每次 900 毫克，每日服用一次

腎功能調整：劑量必須根據肌酐清除率調整

監測：

- ◆ 巨細胞病毒病毒量 (PCR)、
- ◆ 全血球計數 (CBC)、
- ◆ 腎功能 (血清肌酸酐 SCr、肌酐清除率 CrCl)

注意事項：

- 合併使用具有骨髓毒性或腎毒性的藥物
 - 其他抑髓性藥物（例如：化療、TMP-SMX）
 - 腎毒性藥物（例如：鈣調神經磷酸酶抑制劑、兩性黴素 B）

- 建議加強監測。
- 在嚴重巨細胞病毒 (CMV) 疾病中角色有限
 - 口服 valganciclovir 不建議用於嚴重或危及生命的 CMV 疾病。
 - 對於不穩定的病人或有口服吸收不良者，應使用靜脈注射的 ganciclovir 或其他替代藥物。
- 腸胃道吸收
 - 需有足夠的口服吸收。
 - 避免用於下列情況：
 - ◆ 嚴重黏膜炎、腸胃道移植物對抗宿主病 (GVHD)、腸阻塞或失控性腹瀉
- 致畸性與生殖風險
 - Valganciclovir 具有致畸性與基因毒性。
 - 需使用有效的避孕方法：
 - ◆ 治療期間、停藥後至少 30 天 (女性)、停藥後至少 90 天 (男性)
 - 除非收益大於風險，否則孕期避免使用。
- 病毒抗藥性的風險
 - 長期或低於治療濃度的暴露可能導致 CMV 抗藥性。
 - 在接受治療期間若 CMV 病毒量持續上升，應立即進行抗藥性評估並重新檢視治療策略。
- 肝功能損害
 - 一般耐受良好，但肝功能明顯受損的病人應謹慎使用。
 - 定期監測肝酵素。
- 不可替代 CMV 監測
 - 即使在預防期間， 仍然必須定期進行 CMV PCR 監測，尤其是高風險移植受者。

本藥需由醫師處方服用，劑量用法依人及病情而異。請務必遵照醫囑或藥袋上之指示按量按時服用。有任何疑問應請教醫師或藥師。

忘記服藥時該怎麼辦？

- 想起時儘快服用。若想起時已經接近下一次服用的時間(超過 6 小時)，則跳過一次，依照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
中性白血球低下症、貧血、血小板減少症。	臨床醫師，會視情況輸血或施打白血球生成素。或進行劑量調整。

可能加劇移植後的細胞減少症並提高感染風險。	
腎臟 血清肌酸酐上升、腎功能惡化（特別是在同時使用腎毒性藥物時）	臨床醫師會視情況進行劑量調整。
肝臟 輕度升高的 AST/ALT 罕見臨床上顯著的肝毒性	觀察
胃腸道：噁心、腹瀉、腹痛、食慾不振 其他：頭痛、疲倦、發燒、皮疹（少見）	與食物一起服用。當情況嚴重或持續發生時，請告知醫師。