

Mycophenolate mofetil

膠囊

主成份	商品名	中文商品名	含量
Mycophenolate mofetil	CellCept Capsule	山喜多膠囊	250 毫克/膠囊

作用：免疫抑制劑，與其它藥物合併使用於器官(幹細胞)移植病人，預防器官的排斥作用。

用法：遵照醫師指示服用，與水一起整粒吞服，最好空腹(飯前1小時或飯後2小時)服用，如果空腹造成胃不舒服，可以與食物一起服用，但不可併服制酸劑(胃藥)。

注意事項：

1. 服用此藥期間應定期作全血球計數檢測。
2. 『免疫抑制劑』是器官移植絕對不可缺少的藥品。它們可延長新植入器官的壽命、預防排斥作用。為維持器官功能及減少藥品的不良反應，請您確實遵從醫囑服藥，並密切注意身體異樣。
3. 每天服藥時間須固定，未經醫師許可切勿擅自停藥或更改劑量。
4. 服用本類藥品會使您抵抗力減弱，應避免與有傳染病的人接觸。保持傷口清潔，注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮、及手），如有類似感冒或感染症狀時，請立即就醫。
5. 許多的藥品會增加或降低本藥的藥效，使用本藥前，須先告知醫師您正使用的處方或非處方藥。
6. 服用此藥勿授乳；如欲懷孕，請告知醫師。
7. 絕對不可讓任何人服用您的藥。
8. 確定有足夠的藥量，特別是要去渡假時。
9. 請隨身攜帶卡片，上面要記錄您的姓名、疾病、使用之藥品及劑量，醫師姓名、電話號碼。
10. 避免陽光或紫外線的照射，外出穿長袖或擦防 曬油。本藥會使膽固醇升高，需抽血監測。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 如在應服藥的四小時內想起時，立刻服用；若已接近下一劑服用時間，則服用此劑即可，絕對不可服雙倍劑量。
2. 如果忘記二劑以上，一定要與醫師聯絡。

此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
背痛或全身痛、關節痛、不尋常出血或淤血、血尿、血便或黑便、胸痛或心跳不規則、呼吸困難或喘哮、眩暈、喉嚨痛、發熱、發冷、口渴、排尿量增加或頻尿、腳腫、臉或舌頭腫、不尋常疲倦或虛弱、皮膚起疹	立即就醫。
口腔內有白斑或傷口	保持口腔清潔，與醫師聯絡。
高血壓、水腫	告知醫師。
便秘、睡眠失調、厭食、腹瀉、噁心、嘔吐、腹痛、消化不良	厭食、噁心、嘔吐可少量多餐若持續或感到困擾，請告知醫師。