

Valaciclovir 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Valaciclovir HCl	Valtrex Tablet	祛疹易錠	500 毫克/錠

作用：

Valaciclovir 是一種口服抗病毒藥物，在造血幹細胞移植 (HSCT) 中主要用於預防疱疹病毒再活化，尤其是單純疱疹病毒 (HSV) 與水痘帶狀疱疹病毒 (VZV)。

主要用途：

1. 單純疱疹病毒 (HSV) 預防措施

- ◆ 預防單純疱疹病毒復發（口唇或生殖器皰疹）
- ◆ 在深度免疫抑制與黏膜炎期間尤為重要
- ◆ 減少痛苦的黏膜皮膚病變及繼發性細菌感染

2. 水痘帶狀疱疹病毒 (VZV) 再活化的預防

- ◆ 降低帶狀疱疹（herpes zoster）發生風險
- ◆ 降低移植接受者播散性或重度水痘帶狀疱疹病毒感染的發生率
- ◆ 通常在移植後持續服用數月至一年

3. 減少移植相關發病率

- ◆ 預防病毒再活化相關併發症
- ◆ 提升病患舒適度與生活品質

用法：

1. 請遵照醫囑及藥袋上的指示服用，有任何疑問應請教醫師或藥師，並在疱疹症狀出現時，儘早服用。
2. 帶狀疱疹病毒 (VZV) 預防：通常在移植後繼續 6 – 12 個月，在有慢性 GVHD 或持續免疫抑制的患者則會延長
3. 成人典型劑量：500 毫克口服，每日兩次
4. 某些中心使用每天一次 500 mg 作為長期帶狀疱疹病毒預防措施
5. 用藥期間宜定期追蹤腎臟功能。

止疱疹病毒之傳播。

注意事項：

1. 保持感染部位的乾燥及清潔，穿著寬鬆舒適之衣物，以避免刺激傷口。
2. 感染生殖器疱疹時，應避免性行為，以防
3. 服藥前若有下列情形者應告知醫師：
 - ◆ 懷孕或餵母乳的婦女。
 - ◆ 有腎臟疾病的病人。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。但若想起時已接近下一次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量，絕不可以一次服用兩倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
幻覺或全身抽筋現象、皮膚紅疹、呼吸困難	請立即就醫。
頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉等	與食物或牛奶一起服用以減低症狀，若情形嚴重時請告知醫師。