

Co-trimoxazole(Baktar)錠

Co-trimoxazole 錠

主成份	商品名	中文商品名	含量
Co-trimoxazole	Baktar Tablet	撲菌特錠	Sulfamethoxazole 400 毫克/錠 Trimethoprim 80 毫克/錠

作用：

Co-trimoxazole 在造血幹細胞移植 (HSCT) 中主要用於 感染預防，針對多種機會性病原體。

1. 預防肺孢子蟲 (Pneumocystis jirovecii) 肺炎 (PJP)
 - PJP 預防的一線用藥
 - 顯著降低與肺囊蟲肺炎 (PJP) 相關的發病率與死亡率
2. 預防其他機會性感染
 - 弓形蟲 (Toxoplasma gondii) (對血清陽性受贈者很重要)
 - 某些細菌感染 (例如：Nocardia)
 - 一些泌尿道與呼吸道的細菌病原體
3. 造血幹細胞移植 (HSCT) 的標準照護
 - 在長期免疫抑制期間持續使用

在長期免疫抑制期間持續使用本藥適用於細菌引發之各種感染病症，包括泌尿道、肺、耳朵、消化道的感染。也用於治療旅行者腹瀉，及預防與治療由肺囊蟲引起之肺炎。

劑量與用法：

本藥需由醫師處方服用，劑量用法依人及病情而異。請務必遵照醫囑或藥袋上之指示按量按時服用。

開始： 移植定植後或中性白血球恢復充足時開始。

療程持續時間：至少在移植後 6 個月延長至 ≥ 12 個月 或更長時間，適用於：
慢性移植物抗宿主病

本藥通常一天服用一次。用於肺囊蟲肺炎時之劑量可能較高，服用次數亦可能更頻繁。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。若想起時已經接近下一次服用的時間，則跳過一次，依照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

注意事項：

1. 服用本藥前若有下列情形者應事先告知醫師：

- ◆ 曾對磺胺類藥物或口服降血糖藥物過敏者。
- ◆ 有肝臟疾病，腎臟疾病，氣喘或嚴重過敏體質者。
- ◆ G-6PD 缺乏者（即俗稱蠶豆症患者）。
- ◆ 已懷孕或準備懷孕及餵母乳的婦女。

2. 每天至少應喝八杯水或其它飲料。

3. 本藥可能使皮膚對日光的感受性增強，必要時可穿長袖長褲等防護性的衣物或使用防曬製品。藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
皮膚出現紅疹、搔癢感或脫皮現象、喉嚨刺痛、發燒、寒顫、不正常的皮下瘀血或出血，皮膚或眼睛變黃，關節疼痛等	請停藥，並立即就醫。
噁心，嘔吐，食慾不振等症狀	與食物一起服用。當情況嚴重或持續發生時，請告知醫師。