



Mirvetuximab Soravtansine

Elahere[®] | FR α 標靶抗體藥物複合體 (ADC)

—— 卵巢癌藥物簡介教育圖 | 民眾版 ——



1 藥物是什麼？


Mirvetuximab soravtansine 是一種抗體藥物複合體 (ADC)。
它會辨識癌細胞表面的葉酸受體 alpha (FR α)，把細胞毒性藥物帶進癌細胞內。

2 適應症



用於 FR α 陽性、鉑類抗藥性的
上皮性卵巢癌、輸卵管癌或
原發性腹膜癌成人病人。
通常為先前已接受 1-3 種
全身性治療方案者。

3 作用機轉



4 如何給藥？



- 由醫護人員經靜脈輸注給藥。
- 通常每 3 週治療一次。
- 治療前後需依醫囑進行監測與眼睛照護。

5 常見副作用

- 眼科毒性：視力模糊、乾眼、角膜病變、畏光、眼痛
- 腸胃道：噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、腹痛
- 神經系統：疲倦、周邊神經病變 (手腳麻木)
- 其他：肝功能指數上升、肌肉骨骼疼痛、食慾下降

重要提醒：眼睛副作用是本藥的重要監測重點。

6 藥師小叮嚀

- 治療前及治療中要定期接受眼科檢查。
- 依醫囑使用類固醇眼藥水與不含防腐劑人工淚液。
- 治療期間避免配戴隱形眼鏡。
- 若出現視力模糊、眼痛、手腳麻木、持續咳嗽或呼吸困難，請立即告知醫療團隊。
- 治療期間應配合抽血追蹤 CBC 與肝功能。



本圖為藥物衛教用途，實際治療請依腫瘤科醫師與癌症藥師指示為準。

